



En hudpriktest er en måde at screene på allergi for.

Testen udføres ved at en række dråber, som hver indeholder kendte allergener feks pollen, husstøvmider eller pelsdyr placeres på indersiden af underarmen.

Derefter prikkes forsigtigt med en lille lancet gennem dråberne. Overskydende væske tørres af. Efter 10-15 minutter kan resultatet aflæses. Det kan begynde at klø i løbet af ventetiden, men det er vigtigt at undgå at klø på armen, da det kan påvirke resultatet.

Ved positivt resultat ses en lille rød hævelse, der mest minder om et lille myggestik. Ved fortolkning skal resultatet altid sammenholdes med sygehistorien. Man kan også teste for feks fødevarer ved at lave "prik-prik" det vil sige, at man først prikker i den friske fødevarer og derpå i huden.

### **OBS før hudpriktest skal følgende medicin pauseres**

#### **Allergimedisin**

Antihistamin (feks Aerius/Desloratadin, Telfast/Fenoxifenadin) i 3 døgn

Cremer (påsmøring på indersiden af underarmene undgås)

- Hormon-/steroidcreme (feks Locoid) i 3 uger
- Fugtighedscreme i 1-2 døgn

Ved spørgsmål kontakt klinikken forud for besøget