

## Sådan gives medicinen

- Forbered barnet på hvad der skal ske, så barnet ikke bliver utryg under proceduren
- Fjerne den hvide "prop" fra mundstykket
- Medicinen rystes grundigt og sættes fast i det hvide endestykke på spaceren
- Masken anbringes over barnets næse og mund, så den spidse del af masken dækker næsen
- Frigiv medicinen ved et fast tryk på sprayens ende. Der må kun gives 1 pust i spaceren ad gangen
- Lad barnet trække vejret roligt 6 gange. Den hvide ventil skal løfte sig

## OBS

- Hvis barnet trækker vejret for kraftigt/hurtigt, kommer der en lyd fra spaceren
- Skal barnet have 2 pust af medicinen, gentages de sidste 4 punkter
- Fra ca 3 år kan børn ofte tage medicinen direkte fra spaceren uden maske. Barnet skal da bide omkring spacerens mundstykke med tænderne, lukke læberne og trække vejret gennem munden (og mundstykket) 6 gange

## Rengøring

Bruges spaceren dagligt, skal den vaskes 1 gang om ugen. Masken skal vaskes hyppigere.

- Skil spaceren ad i 4 dele (maske, spacer, mundstykke og det hvide endestykke)
- Læg delene i et varmt sæbebad i 10 minutter -bevæges kraftigt i 1 minut
- Skylles med rent vand og stilles til dryptørring
- Spaceren samles når delene er helt tørre